

Herrero, J. et al. (1964) Cartografía de Frutales de Hueso y Pepita. Capítulo IV: Apéndice de variedades: MANZANO

de Ojo

Tamaño: Medio a pequeño.

Forma: Característica, más ancha la parte del ojo que la del pedúnculo. Contorno levemente irregular.

Cavidad del pedúnculo: Estrecha, globosa, generalmente poco profunda, fondo con chapa ruginosa de un verde mezclado con canela que con frecuencia rebasa la cavidad. **Pedúnculo:** Corto, semi-grueso.

Cavidad del ojo: Amplia, de poca profundidad, fondo fruncido y con leve ruginosidad. Bordes ondulados o mamelonados. **Ojo:** De tamaño medio y cerrado. Sépalos triangulares, muy compactos en su base, de puntas agudas, erguidas, convergentes o entrecruzadas, verdosos y con suave tomentosidad grisácea.

Piel: Fina, suavemente grasa. **Color:** Fondo verde amarillo. Chapa rosa vivo o suavemente cobriza con pinceladas irregulares en forma barreada de rojo vivo a ciclamen que recubren gran parte del fruto. Punteado abundante mas o menos visible, ruginoso o del color del fondo.

Tubo del cáliz: Pequeño y triangular, estambres situados por su mitad.

Corazón: Pequeño, desplazado hacia el ojo, bulbiforme o ausencia de líneas que lo enmarcan. Eje entreabierto. Celdas alargadas, redondeadas y muy puntiagudas en su inserción.

Semillas: Pocas y de forma variada, algunas abortadas.

Carne: Color crema con puntos verdosos y amarillo intenso junto a la epidermis. Crujiente, fundente, jugosa pero a veces se vuelve un poco harinosa. **Sabor:** Agradable, acidulada, aunque a veces deja una tenue astringencia.

Maduración: Invierno.

